

Voyage de M. E. Simon au Venezuela

(Décembre 1887—Avril 1888)

20^e Mémoire (1)

HÉMIPTÈRES HÉTÉROPTÈRES

1^{re} PARTIE.

CAPSIDES

Par O. M. REUTER.

Séance du 22 juillet 1891.

Divisio **FULVIARIA** Uhler (= *Teratodellaria* Reut.).

1. **FULVIUS ATRATUS** Dist., Biol. Centr.-Amer., Heter., p. 282, tab. xxvii, fig. 48 (forte). — *Nigro-fuscus, sexta parte apicali articuli secundi antennarum, maculis qualquier mesonoti, fascia corii ante medium externe multo latiore, interne medium suturæ clavi attingente, arcu basali cunei angusto pedibusque flavo-testaceis; femoribus omnibus dimidio basali, posticis etiam ante upicem fuscis; rostro piceo; antennarum articulo primo capiti æque longo, secundo primo duplo longiore et hinc æque crasso, nigro-pubescente.* — Long. fere 5 mill. — Colonia Tovar.

A descriptione Cel. Distantis divergit colore articuli secundi antennarum cuneique. An varietas vel species propria?

2. **Fulvius Simoni**, n. sp. — *Fusco-niger, antennarum articulo primo toto secundoque magis quam tertia upiculi, corii ipsa basi fascia-*

(1) Voir 15^e mémoire (*Coléoptères — Lamellicornes*, par le Dr E. Candèze), Annales 1891, p. 329. On y trouvera la liste des quatorze autres mémoires qui précèdent. — 16^e mémoire (*Arachnides : Chernetes (Pseudoscorpiones)*, par L. Balzan), Annales 1891, p. 497, pl. 9, 10, 11 et 12. — 17^e mémoire (*Hyménoptères*, par Robert du Buysson et T. A. Marshall), Annales 1892, p. 53, pl. 3 et 4. — 18^e mémoire (*Coléoptères Hétéromères*, par L. Fairmaire), Annales 1892, p. 77. — 19^e mémoire (*Coléoptères — Colydiides*, par A. Grouvelle), Annales 1892, p. 98, 5 bois.

Ann. Soc. ent. Fr., 1892. — Décembre 1892.

que ante medium sat æquali, dimidio basali cunei, coxis posticis, trochanteribus, extremo apice femorum, tibiis tarassisque flavo-testaceis; antennarum articulo primo capite a latere viso saltem 1/5 breviore, secundo primo duplo longiore et hoc tenuiore, subtilissime pallido-pubescente; rostro picco. — Long. 3 1/2 mill. — Corozal.

Præcedenti minor, antennis aliter coloratis, constructis et pubescensibus, cuneo basi latius pallido femoribusque extremo apice excepto fuso-nigris divergens.

Divisio **MIRARIA** Reut.

Dolichomiris Reut., Ad cogn. Heter. Africae occid. (in Oefvers. Finska. Vet. Soc. Foerh., XXV), p. 30, 59.

Corpus vulde elongatum, parallelum, glabriuseulum; capite porrecto, horizontali, latitudine multo longiore, a latere viso fere parallelogrammico et altitudine duplo longiore, vertice sulco distineto, fronte apice acutangnlariter prominulo ultra basin clypei breviter producto, clypeo fortiter prominente, margine apicali retrorsum vergente; rostro articulo primo longitudine capitinis; antennis corpore longioribus, articulo primo pronoto capitiisque usque ad basin clypei longitudine æquali vel subæquali, primo toto basique secundi dense pilosis, hoc basin versus incrassato; pronoto scutelloque impanctatis, illo latitudine basali longiore, lateribus acutis, antice marginatis, basi profunde sinuata; scutello pronoti longitudine, basi detecta utrinque carina transversa vel obliqua; femoribus linearibus, tibiis anterioribus interne spinulosis, posticis spinulis destitutis, dense longe et molliter pilosis. A Nostotira Fieb. fronte apice integra solum basin clypei tegente divergens.

3. **D. tibialis**, n. sp. — *Pallide flavens, nitidulus, atomis plerumque serintis articuli primi antennarum, linea marginis apicalis clypei, linea media longitudinali capitinis lineisque duabus longitudinalibus mediis ralde appropinquatis pronoti et scutelli, vitta utrinque lateraliter per caput et pronotum ducta ab oculis interrupta, vitta per latera capitinis, pectoris et ventris ducta tibiisque posticis cum tarsis coccineis vel ad partem fusco-coccineis, tarsis articulo tertio apice fusco; scutello parte basali sulphurenti, utrinque carina leviter arcuata obliqua; antennis articulo primo dense semiadpressim longe flavo-piloso, articulo secundo primo circiter 3/4 longiore, 2/3 basilibus dense pilosis, pilis versus apicem sensim brevioribus, tertio secundo adhuc longiore; membrana leviter fumata, iridescente, venis pallidis.* — ♀. Long. 9 2/3 mill. — Colonia Tovar.

4. COLLARIA OLEOSA Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 238, tab. xxiv, fig. 2. — Colonia Tovar, San-Esteban, Caracas.

Divisio **BRYOCORARIA** Reut. (= *Bryocoraria* Reut. et *Eccritotarsaria* Reut. et Berg.).

Capite nutante vel verticali, vertice raro sulco vel fovea longitudinali instructo; rostro plerumque admodum crasso et brevi, raro coxas posticas uttingente: pronoto strictura apicali annuliformi distineto, lateribus obtusis; hemielytris vaneo discreto, sæpe (non tamen semper) vena corii cubitali a basi ultra medium impressa, dein abrupta, interdum tota deleta, membrana areola unica triangulari vel rarius ovali; alis areola hamo destituta; xypho prosterui marginato; coxis posticis ab epipleuris hemielytrorum sat remotis: tarsis versus apicem ampliatis et incrassatis, aroliis magnis a basi maxime diraricatis, ad unguiculos approximatim iisque parum brevioribus.

5. **ECCRITOTARSUS SPLENDENS** Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 284, 4, tab. xxviii, fig. 4. — Varietas margine lateralí corii pallide ochraceo, pronoto macula media basali nigricante. — Caracas.

Cyrtocapsus Reut., Caps. ex Amer. bor. (in Oefvers. Svenska Vet. Akad. Foerh., 1875, n° 9), p. 78. Synon. : *Perithous* Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 302.

Corpus convexum; capite valde nutante vel subverticali, basi pronoti fere duplo angustiore, basi cum oculis longitudini æque lato, infra oculos rostrato-producto, gula sat longa, obliqua, buccidis sat elevatis, brevibus, vertice immarginato, clypeo sat urenato, u latere viso ubique fere æque lato, compresso, basi in linea inter apices oculorum ducta posita, u fronte impressione vel incisura discreta, angulo faciali acuto; oculis oblongo-ovatis, sat mauguis, orbita interiore parallelis vel rix sinuatis; rostro apicem mesosterni subattlingente vel ejus medium vix superante, crassinsculo, articulo primo basin capitis haud attingente, secundo primo vir longiore; antennis mox supra tertiam partem inferiorem marginis interioris oculorum insertis, articulo primo sat longo, tenui, clypeam vir superante, secundo latitudine capitis breviore, versus apicem sensim leviter incrassato, tertio secundo breviore, quarto gracili, longissimo; pronoto sat dense impresso-punctato, callis sat mauguis fere quadrangularibus, disco pone callos alte convexo, versus marginem basalem iterum declivi, margine basati late rotundato, medio subtruncato, longitudine vir vel paulo latiore, lateribus subsinuatim versus apicem

fortiter angustato, strictura apiculi distincta; hemelytris lăvibus, opacis, maculatim griseo-pubescentibus, embolio late incrassato, corii vena unica usque ad medium impressa dein abrupta, fractura laterali cunei profunde excisa, cuneo declivi, latitudini æque longo; coxis posticis ab epipleuris hemelytrorum remotis; pridibus breviuseulis, femoribus posticis usque ad medium marginis superioris sat tumido-convervis, dein usque in apicem parallelis, tibiis muticis.

6. **C. femoralis**, n. sp. — Niger, opacus, capite, pronoto scutelloque pube longu densu cinerea tectis, capite utriusque lineolis transversalibus denudatis, maculis lateralibus pectoris et ventris pube suburgentea longu vestitis; antennis articulo primo, macula apicali articuli secundi rostri, coxis, femoribus basi, tibiis circiter 3/5 apicalibus tarsisque albidis, his apice leviter infuscatis; antennis pallide luteis, articulo tertio versus apicem quartoque infuscatis, articulo secundo latitudine verticis oculique unici via longiore, tertio secundo circiter 1/4 breviore et primo æque longo, quarto duobus precedentibus simul sumptis parum breviore; hemelytris nigrofuscis, maculis cinereo-pubescentibus notatis, embolio anguloque interiore corii latius fuscescenti-testaceis; membrana albida, vena brachiali et parte interiore areola infuscatis. — Long. 2 1/2 mill. — San-Esteban.

C. CALIGINEO Stål (= *Perithoo pallidipedi* Dist., loc. cit., p. 302, I, tab. XXIX, fig. 41) similis, colore rostri, femoribus basi exceptu tibiarumque 2/3 basulibus nigris nec non pubescentia longiore et densiore mox distinguendus.

Physetonotus, nov. gen.

Corpus ovale, capite, pronoto scutelloque nitidis, impresso-punctatis; capite subverticuli, basi pronoti magis quam duplo angustiore, basi cum oculis longitudini fere æque lato, infra oculos rostrato-producto, u latere viso brevi et alto, gula vix distinguenda, vertice immarginato, fronte perpendiculari, clypeo sut prominente, sut compresso, u latere viso ubique fere æque lato, leviter arcuato, nonnihil retrorsum vergente, basi u fronte iucisura deseretu, infra lineam inter apices oculorum ductam posita, angulo faciali recto, genis altis; oculis ovalis medium laterum capitilis haud superantibus, orbitu interiore subparallelis; rostro articulo primo medium xyphi prosterni attingente; antennis ad apicem oculorum vel mox supra hunc insertis, articulo primo apicem clypei haud superante, secundo latitudine capitilis haud vel paullulum longiore, versus apicem seusim teriter incrassato, ultimis gracilibus, simul secundo saltem

duplo longioribus, tertio quarto vix vel paullo breviore; pronoto longitudine vix latiore, dense et fortiter impresso-punctato, angulo apicali magis minusre discreto, callis parvulis, nitentibus, apice appropinquatis, disco mox pone callos altissime tumido vel fere inflato-convexo, iterum ad marginem basalem decliri, parte inflata structura variabili, lateribus versus apicem fortiter angustatis, basi quam apice circiter triplo latiore; hemelytris levibus opacis, locis sericeo-micantibus variegatis, embolio bene discreto, fractura cunei haud excisa, cuneo declivi, latitudini basali æque longo; coxis posticis ab epipleuris hemelytrorum remotis; pedibus breviusculis; femoribus posticis margine superiore usque ad medium sat concrexis, dein in apicem usque subparallelis, tibiis muticis.

A genere præcedente capite verticali a latere viso breviore, angulo ejus faciali recto, antennis inferius positis, articulo earum tertio primo saltem duplo longiore, pronoti callis minutis discoque ejus postico adhuc multo altius convexo, fortius impresso-punctato, fractura cunei haud profunde excisa, etc., mox distinctus.

Hoc genus in subgenera duo sequentia dieido :

1. **Physetonotus** mihi : fronte media foveola impressa; pronoto poslice supra scutellam inflato-producto, æqualiter convexo, margine basali late rotundato; scutello rix visibili.

2. **Orinonotus** mihi : fronte medio vix impressa sed lœvigata; pronoto disco postico utrinque ad latera medioque longitrorum impresso, versus marginem basalem perpendiculariter declivi, margine hoc truncato; scutello solum basi detecto.

7. **Physetonotus (Physetonotus) atratus** Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 285, 40, tab. xxvi, fig. 20 (*Eccritotarsus*). — Caracas.

8. **Physetonotus (Orinonotus) Simoni**, n. sp. — *Niger, nitidus, parcus tenuissime griseo-pubescentis, pronoto postice impressionibus minus profundis, gibbis inter eas parum altis obtusissime rotundatis; capite marginibus orbitalibus interioribus apiceque utrinque juxta clypeum testaceis; antennis, rostro, pedibus totis orificeisque metastethii albidis; hemelytris brevissime subseriatim flavicanti-puberulis, corio locis sericeo-cinerascentibus, embolio macula majore ante medium aliaque minore quadrangulari ante apicem nec non cuneo membranaque albidis, margine basali cunei anguste nigro; antennis articulo secundo latitudini capitis cum oculis longitudine subæquali, tertio secundo paullo longiore et quarto æque longo.* — Long. 2 3/4 mill. — Caracas.

A Phys. (Orin.) incurvo Dist. (Biol. Centr.-Amer., Het., p. 285, 8, tab. xxvi, fig. 49, Ecclitotarsus), cuius specimina e Mexico eraminiuri, differt corpore minore, multo parcior et tenuissime cinereo-pubescente, magis nitido, capite latius nigro, venis membranarum pallidis (nec fuscis), femoribus omnibus totis albidis (nec posticis ante apicem infuscatis vel nigro-anulatis), praecipue pronoto nigro (nec zebrante), non nisi tenuissime (nec dense et longe) cinereo-pubescente, disco ejus postico impressionibus longitudinalibus multo obtusioribus (nec profundis et gibbas duas magnas et altas inter se formantibus).

Pristoneura, nov. gen.

Corpus parvum, alte convexum; capite parvo, larri, prouoto fere triplo angustiore, subverticali, ab antico viso latitudine cum oculis distinete breviore, vertice immarginali, fronte medio levissime impressa, clypeo prominente, subcarinato-compresso, sat fortiter areolato, basi a fronte discreto, ipsa basi mox supra lineam intr serobes antennarum ductam posita; capite a latere viso brevi, gula eis distingueuda, genis humilibus, angulo faciali recto; oculis oblongis, in genas longe extensis, orbita interior parallelis; rostro crassiusculo, coras intermedias attingente; auten tensis fere ad tertium inferiorem partem marginis interioris oculorum insertis, articulo primo clypeum rix superante, secundo latitudine capitis haud longiore, versus apicem sensim leviter incrassato, ultimis longis; prouoto distinete transverso, impresso-punctato, annulo collari distincto, rallis ad apicem appropinquatis, valde transversis, parvis, obliquis, disco pone eos versus basin sensim alte conceexo, margine basali truncato, lateribus rectis versus apicem fortiter incrassatis, apice quam basi triplo angustiore: scutello sat magno, impresso-punctato, basi depressa detecta; hemelytris eneo brevi perpendiculariter declivi, fractura profunda, vena clari suturæ appropinquata recta, vena corii juxta suturam clavi non nihil areolata margineque interiore embolii onusibus transversim dense et fortiter carinulatis, vena cubitali corii nulla, hemelytris retero levibus, parce pubescentibus, embolio versus apicem dilatato; membrana areola magna, unica, vena ejus brachiali versus basin areolata; metastethio orificiis parvis rotundatis; pedibus breviusculis, coxis posticis ab epipleuris hemelytrorum longe remotis, femoribus gracilibus, tibiis muticis.

9. **P. picea**, n. sp. — Obscure picea, subtiliter parcior pallido-pubescent, infrae piceo-nigra, nitida; rapite, dimidio basali articuli

secundi antenuarum, orificio metastethii pedibusque testaceis; antennis articulo secundo primo duplo longiore, tertio secundo fere dimidio longiore; pronoto et scutello deuse sat fortiter impresso-punctatis. — Long. 1 3/4 mill. — Colonia Tovar.

Divisio PERISSOBASARIA mihi.

Capite subporrecto, fronte subhorizontali, vertice linea longitudinali impressa, loris haud discretis; rostro gracili; pronoto strictura apicali annuliformi distinctissima, lateribus obtusis; hemelytris cuneo discreto, corio venis brachiali et cubitali (sat ægre) distinguendis; membrana biareolata; alis areola hamo destituta; pedibus gracilibus, tarsis brevibus, crussiusculis, inferne deuse pilosis, articulo primo longo, secundo brevissimo, in medio plagæ superioris primi immerso, inferne primo saltem triplo breviore, tertio primo purum breviore, versus apicem distincte incrassato; unguiculis fere a medio subito angulato-curvatis, aroliis angustis cum iis connexis fere medium unguiculorum attingentibus.

Divisioni Bryocoraria Reut. proxima, differt aroliis angustis cum unguiculis totis connexis, corio vena cubitali usque in apicem distinguenda, haud impressa, membrana areolis duabus instructa. A divisione Capsaria Reut. aroliis cum unguiculis connexis, a divisione Dicypharia Reut. loris capitis haud discretis et tarsis articulo secundo primo et tertio multo breviore, ab ambobus articulo tarsorum brevium ultimo versus apicem distincte incrassato-ampliato distinguenda.

Perissobasis, nov. gen.

Corpus oblongum, superne pilosum; capite fere porrecto, levissime nutante, ab antico viso latitudine vix longiore, vertice fortiter carinato-marginato, fronte subhorizontali, basi linea media longitudinali impressa, apice subito perpendiculari; capite a latere viso altitudine paullo longiore, clypeo perpendiculari, basi in linea inter scrobes antennarum ducta posita, angulo faciali recto, loris haud discretis, genis humilibus, bucculis sat elevatis, gula dimidium cupitis occupante, horizontali, leviter convexa; oculis haud prominentibus, in genas longe extensis, orbita inferiore infra medium fortiter sinuatis; rostro gracili, apicem mesosterni attingente, articulo primo basin cupitis ultingente; antennis pilosis, in sinu oculorum inferne insertis, articulo primo maximo, pronoto annulo collari excepto æque longo, valle dilatato-explanato, reliquis gracilibus,

linearibus, secundo ultimis simul sumptis multo longiore: pronoto capite multo longiore, apice capite angustiore annulo lato colluri instructo, basi quam apice triplo et latitudine paullo latiore, lateribus usque ad annulum apicalem subrectis, callis transversim ad unum confluentibus, pone eum sulco transversali latera tamen haud superante instructo, disco postico versus medium sensim declivi, remote impresso-punctato, margine basali levissime rotundato; scutello basi anguste detecto; hemelytris parallelis, embolio lato nonnihil reflexo, corio venis brachiali et cubitali (sat zegre) distinguendis, cuneo subhorizontali, elegato-triangulari, membrana biareolata; pedibus gracilibus, longe pilosis, femoribus elongatis, linearibus, tibiis spinis rigidis destitutis; terebra seminie longa.

10. **P. aurora**, n. sp. — *Inferne punicea vel sanguinea. superne capite lutescente, pronoto scutelloque pallide flavescentibus, illo limbis lateralibus late fuscis, hemelytris pallide flaventibus, colore in puniceum vergentibus, embolio apice excepto pallido, clavo limbo exteriore excepto vorioque basi et macula interiore apicali fuscis, membrana subhyalina, venis obscure puniceis, areola majore leviter infuscata, ejus parte juxta venum cubitalem areolaque minore albida; rostro, antennis pedibusque flavicanti-albida; illarum articulo primo croceo, secundo primo duplo longiore, apice tenuiter croceo, tertio primo breviore, quarto iterum tertio breviore; capite, scutello hemelytrisque lavibus, pronoto remote impresso-punctato; vertice oculo fere 1/3 latiore. — ♀. Long. 3 2/5 mill. — San-Esteban.*

Divisio **MONALONIONARIA** mihi (== *Valdasaria* Dist.).

11. **MONALONION ANNULIPES** Sign., Ann. Soc. ent. Fr., 3^e sér., VI, p. 50. — Dist., Biol. Centr.-Amer., Het., p. 216, tab. xxii, fig. 25. — Caracas.

Varietas nigra, basi corii pallida basique abdominis rubro, aliisque thorace toto rubro.

Divisio **CAPSARIA** Rent.

12. **Phytocoris Bergrothi**, n. sp. — *Grisescens, superne pilis subdpressis vel semi-idpressis (pronoti magis exsertis) pallidis dense pilosus, capite pronotoque antice albida; clypeo lorisque sanguineo-conspersis; fronte utrinque lineis transversalibus vittaque media, vertice utrigine postico, pronoto maculis duabus apicalibus aliisque duabus mox*

pone cullos nec non scutello macula media basali aurantiacis; pronoto postice lateribusque usque ad apicem griseocele, ante marginem posticum maculis quatuor anguste confluentibus nigris, ipso margine albido; scutello apicem versus leviter virescenti-pallido; hemelytris vena clavi. corio juxta suturam clavi margineque exteriore nigro-conspersis. cuneo dense minutissime nigricanti-consperso, apice late punctoque in tertia basali parte suturae membranæ nigris, extremo apice pallido; corio nitidulo, angulo interiore macula opaca sordide virescente postice infuscata; membrana pallida, griseo-irrorata, venis omnibus pallidis; antennis albidis, articulo primo tenui, pronoti longitudine, sanguineo-fusco-consperso. secundo toto pallido, longissimo, primo duplo et dimidio longiore, ultimis nigris, tertio basi albo; rostro medium ventris sat longe superante, albido, apice nigro; pedibus albicantibus, femoribus apice nigro-conspersis, tibiis saltem anticis (postici desunt) breviter pallido-spinulosis, margine antico usque ad partem quartam apicalem nigris; orifice metastethii virescentibus; capite fortiter nutante, clypeo a fronte leviter discreto, angulo fasciali acuto, vertice feminæ oculo vix lutiore. — ♀. Long. 5 3/4 mill. — Caracas.

Signatura tibiarum P. tibiali Reut. ex America boreali affinis, mox tamen notis supra datis distinguendus.

13. Phytocoris tripunctatus, n. sp. — *Pallide sordide flavens, sat nolidus, superne pallido-pubescentes; cupite linea longitudinali media usque ad basin clypei ductu colloque guttis duabus aurantiacis; cupite lateribus vittis duabus ante-ocularibus, pronoto macula utrinque ad annulum apicalem maculaque paullo majore rotundata media mox pone cullos, epimeris prothoracis vittis duabus longitudinalibus, metastethio lateribus nigris vel nigro-rufis; scutello angulis basalibus vittisque duabus mediis nigro-fuscis vel fuscis; clavo corioque interne magis minusve fusco-conspurcatis, cuneo apice concolori vel fuscescente; membrana sordide fuscescenti-conspurcata, venis sordidis vel rufescensibus; antennis fuscis paullo magis robustis (♂) vel pallidis, gracilioribus, articulo secundo apice nigro (ultimi desunt), articulo primo setis rigidis destituto, pronoto et dimidio oculi a supero visis æque longo (♂) vel pronoto parum longiore (♀), secundo primo circiter duplo et dimidio longiore; rostro pallido, medium ventris sat superante, apice nigro; pedibus pallide flarentibus, femoribus posticis versus apicem sordide fuscescenti-nebulosis, tibiis omnibus innotatis, testaceo-spinulosis, tarsis apice leviter infuscatis; pronoto subruguloso-punctulato; capite verticali, fronte apice sat convexa, clypeo ante apicem distinete depresso, angulo*

faciali levissime acentiuseculo, vertice oculo haud vel paullulum latiore. — Long. 6 1/2 mill. — Colonia Tovar.

Species pubescentia minus intricata, signatura insigni pronoti, antennis sexuum discoloribus, pronoto subruguloso-punctulato distinctissima.

Chrysodasia, nov. gen.

Corpus oblongo-ovale, superne sat fortiter aureo-pubescent; capite cum oculis magnis exsertis apice pronoti sat multo latiore, nutante, ab antico viso subtransverso, aureo-pubescente, vertice margine postico arcuato, utrinque ad oculum macula glabra et levigata notata, fronte utrinque strigis obliquis denudatis sculpturata, clypeo sat fortiter arcuato, basi a fronte leviter diserelo, ipsi basi in linea inter scrobes antennarum ducta posita, gula obliqua dimidium capitis attingente, genis valde humilibus, angulo faciali acuto; oculis magnis, granulatis ad maximum partem ultra annulum pronoti apicalem exsertis, orbita interiore fortiter emarginalis; rostro apicem mesosterni paullo superante, versus apicem sensim acuminato, articulo primo medium xyphi prosterni attingente; antennis in sinu oenlorum inseritis, articulo primo apicem clypei paullo superante, secundo versus apicem sensim incrassato, latitudine capitis multo longiore, ultimis simul secundo brevioribus; pronoto trapeziformi transverso, basi quam apice triplo latiore, lateribus rectis, disco versus apicem sat fortiter convexo-decliri, ubique etiam anullo apicali aureo-pubescente, solum callis glubris, leviter obliquis, rectangularibus, medio sat distantibus; scutello impresso-punctulato, sat convexo, apice depresso; hemelytris obsoletius punctulatis, minus dense aureo-pubescentibus, corio furca cubiti distincta, cuneo concolore, sat fortiter decliri, incisura parum profunda; orificeis metastethii distinctissimis; pedibus breviusculis, femoribus posticis elongatis, tibiis pilis rigidis decumbentibus pilosis, sed spinulis destitutis, posticis leviter curvatis, tarsis articulo primo secundo paullo breviore, unguiculis sat fortiter arcuatis, basi in denticulum ampliatis.

A Lygo Hahn, Reut. oenlis majoribus et magis exsertis, capite et anulo apicali pronoti pubescentibus, fronte strigosa, tibiis omnibus spinulis destitutis pubaque aurea divellenda divergens; Ab Agnocori Reut., cui primo intuitu sat similis, structura capitum, antennarum et pronoti tibiisque totis matricis distincta; a Pocilosecto Fieb. fronte strigosa, pronoto scutello fortiter impresso-punctulatis, orificeis metastethii distinctioribus, pedibus brevioribus, tibiis matricis, posticis leviter arcuatis non distinguenda.

44. **C. strigifrons**, n. sp. — *Testacea vel flavo-ferruginea, superne fortius sat longe aureo-pubescentia, pronoti lateribus magis exserte pilosis; antennis articulo secundo versus apicem ultimisque nigris, tertio basi et apice angustissime albido, secundo latitudine basali pronoti paullo breviore, tertio secundo duplo breviore, quarto tertio fere 1/3 breviore; pronoto basi longitudine vix duplo latiore.* — Long. 5 1/2 mill. — Colonia Tovar.

Divisio **DICYPHARIA** Reut.

45. **ANNONA BIMACULATA** Dist., Biol. Centr.-Amer., p. 290, tab. xxvii, fig. 25 (*Ania*), p. 297.

Varietas pronoto maculis disci postici destituto. — Caracas.

Genus divisionis Dicypharia nec Phytocoraria !. Oculis pronoto contignis, articulo primo antennarum longo, tenui, sutura clavi suturique embolii explanati interiore transversim dense carinulatis articuloque secundo tarsorum posticorum tertio parum longiore insigne.

Divisio **CYLLOCORARIA** Reut.

Schizonotus, nov. gen.

Corpus angustum, laxe, nitidum, medio constrictum; capite magno, fere semigloboso, fortiter nutante, ab antico viso basi pronoti paullulum angustiore, late breviterque ovato, vertice supra oculos elevato, margine arenato retrosum supra annulum apicalem pronoli producto, fronte convexa cum verlice et clypeo in arcum communem confluente, clypeo sat lato, toto depresso, basi in linea inter scrobes antennarum ducta positu; capite a latere viso altitudine multo breviore, loris discretis angustis versus scrobes antennarum vergentibus, angulo faciali acutinsculo, bucculis linearibus, genis sat humilibus, gula obliqua dimidium capitidis occupante; oculis ne minime quidem prominentis, sublaevibus, in genas sat longe extensis, orbita interiore infra medium subsinuatis versus apicem vix divergentibus, orbita posteriore late sinuatis; rostro medium mesosterni attingente, gracili, articulo primo bucculas haud superante, secundo et tertio æque longis, quarto tertio longiore; antennis paulo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo brevi, apicem clypei haud attingente, secundo latitudini verticis longitudine æquali, versus apicem leviter incrassato, duobus ultimis crassis, quarto fusiformi; pronoto latitudine postica parum breviore, ante medium valde constricto et sulco transversali profundo latera superante instructo, parte

anticu a medio versus apicem dilatata lateribus rectis, apice tuberculis tribus conicis, medio lateralique utrinque, instructa, tuberculo medio antrorsum, lateralibus antrorsum et extrorsum vergentibus; parte pronoti postica versus basin fortiter dilatata, lateribus rectis, inter angulos basales strictura media magis quam triplo latiore, disco a strictura versus basin in gibbam altissimam transversim compressam margine supero late arcuatam surgente, hac gibba medio subimpressa, postice perpendiculariter vel fere antrorsum nutante; scutello parvulo; hemelytris paullo ante medium corii parallelis, embolio dein subito usque ad apicem fortiter dilatato-rotundato, cuneo brevi, embolio fere loto cuneoque externe versus latera deflexis, membrana biareolata; rima orificiorum metastethii subtili, transversa; abdomine dilatato, terebra feminæ longa; tibiis anticis submuticis (pedes postici desunt).

Genus structura antennarum, pronoti et hemelytrorum valde insigne; structura capitis et rostri articuloque primo antennarum brevi Globicepi sphegiformi Rossi affinis.

16. **S. dromedarius**, n. sp. — *Superne fulvus vel ferrugineus, inferne cum femoribus in sordide coccinenum vergens, parce lenissime pallido-pubescent, antennarum articulo primo apiceque secundi nec non coris posterioribus albidis; antennis articulo primo basi et vitta superiore secundoque, apice excepto, fuscis, ultimis nigris, tertio secundo fere 1/4 breviore, quarto tertio æque longo; tibiis tarsisque fuscis, his dimidio basali albidis; hemelytris fulvis vel cinnamomeis, basi clari fasciaque ante medium corii dense nireo-squamosis, coria pone hanc fasciam, cunea membranaque nigro-piceis, embolio fulvo, apice rufo-piceo. — ♀. Long. 2 1/2 mill. — Caracas.*

